

Рис. 2. Возрастная структура заболевших больных корью

Выводы

В 2012 году Инициатива по борьбе с корью и краснухой представила новый Глобальный стратегический план борьбы с корью и краснухой, охватывающий период 2012-2020 годов. План включает новые глобальные цели на 2015 и 2020 годы: снизить глобальную смертность от кори, по меньшей мере, на 95% по сравнению с уровнями 2000 года. Несмотря на рутинную иммунизацию детей против кори с высоким процентом охвата в Туркестанском регионе (до 99%) в последние годы, отмечается высокая заболеваемость корью. В связи с этим требуется дальнейшее исследование причин заболеваемости привитых. Для проверки эффективности вакцинации против кори рекомендуется провести серологический анализ у привитых людей.

Список литературы

1. Бектимиров Т.А. // ЖМЭИ. – 1990. – № 6. – С. 104-108.

2. Лосицкая Н. – зам. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах // Знамя труда. – №95. – 03.08.2011.

3. Баешева Д.А., Кузгибекова А.Б., Кузгибекова С.Б., Кенжебаева С.К., Идрисова Л.М., Исакова А.Б., Капанова З.Б. Эпидемиологический надзор за вакционоуправляемой инфекцией – механизм сдерживания антибиотикорезистентности // Наука и здравоохранение. – 2014.

4. Амиреев С.А., Темирбеков Ж.Т., Нажмеденова А.Г., Кудайбергенов К., Ирсимбетова Н.А. Профилактика инфекционных заболеваний иммунным методом. Эпидемиология: учебник. – Т. 1. – Гл. 23. – Алматы, 2000. – С. 396-454.

СОСТОЯНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

Лисунова С.А., Нуцалова А.А.,
Магомедгаджиев М.Г., Абдулхаликов З.А.

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия,
e-mail: zas-katya777@mail.ru

Проблема стоматологического здоровья в обеспечении качества жизни людей до сих пор находится в центре внимания исследователей [1,2,3]. Разрабатываются новые здоровьесберегающие программы и технологии у различных слоев населения [4,5].

Стоматологическое здоровье студенческой молодежи характеризуется высокой распространенностью и интенсивностью заболеваний полости рта. Чаще всего встречается кариес и его осложнения, заболевания пародонта, преждевременное удаление зубов, аномалии зубов [6,7].

Целью исследования было изучение состояния стоматологического здоровья студенческой молодежи.

Объект исследования – 56 студентов различных вузов города, из которых 21 человек – лица мужского пола и 35 – лица женского пола. Стоматологический статус изучали по общепринятой методике.

Результаты исследования

Выявленная при обследовании студентов патология обусловливает стоматологическое здоровье студентов как имеющее нуждаемость в стоматологической помощи. Самой распространенной патологией при осмотре полости рта оказался кариес зубов 91,3%. Индекс КПУ составил 5,85, при этом индекс К равнялся 2,12, П – 3,3, индекс У – 0,43. Структура индекса КПУ выявила у юношей преобладание кариозных зубов, у девушек пломбированных зубов.

Следующей выявленной патологией были заболевания пародонта, которые чаще всего наблюдались в виде локализованного катарального гингивита – 67%. У 76,4% обследованных встречались зубные отложения: мягкий зубной налетом, над- и поддесневые зубные отложения. Зубные отложения у юношей встречались в 1,5 раза чаще, чем у девушек. Аномалии, прикуса, аномалии положения, скученность зубов , тремы, диастемы встречались у 31% студенческой молодежи.

Таким образом, выявленная высокая распространенность стоматологических заболеваний у студенческой молодежи требует особенного внимания для проведения профилактических программ. Полный охват стоматологической помощью студенческих групп приведет к улучшению стоматологического здоровья у работающей группы населения нашей страны.

Список литературы

1. Денисенко Л.Н., Данилина Т.Ф., Ткаченко Л.В., Касибина А.Ф., Данилина Е.В. Влияние железодефицитной анемии на состояние полости рта беременных женщин // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2007. – № 3. – С. 45.

2. Крюкова А.В., Осипов А.Е., Денисенко Л.Н. Стоматологическое здоровье студентов // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 9. – С. 54.

3. Ягупова В.Т., Федотова Ю.М., Филюк Е.А., Денисенко Л.Н. Врач-стоматолог как исполнитель медицинских услуг // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 11-3. – С. 22-26.

4. Вирабова А.Р. К оценке здоровьесберегающего потенциала современной школы // Вопросы современной педиатрии. – 2006. – № 8. – С.106-107.

5. Сызранова Н.Н., Денисенко Л.Н. Внеучебная деятельность школьников здоровьесберегающей направленности // Здоровье и образование в XXI веке. – 2012. – Т. 14, № 4. – С. 336-337.

6. Проценко А.С., Макеева И.М. Факторы, влияющие на распространенность основных стоматологических заболеваний у студенческой молодежи Москвы // Стоматология. – Т. 89. – 2010. – № 1. – С. 4-6.

7. Цырюльникова А.А., Крюкова А.В., Денисенко Л.Н. Стоматологический статус студентов // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 6. – С. 120-121.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Макарова К.О., Куанышбаев С.Р., Балдина А.А.,
Бегайдарова Р.Х., Стариков Ю.Г.

«Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан,
e-mail: r.h.begaidarova@mail.ru

Введение

В настоящее время корь продолжает оставаться одной из причин смерти среди детей раннего возраста и развития тяжелых осложнений, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины.

Несмотря на резкое снижение заболеваемости корью за последние десятилетия она продолжает оставаться весьма актуальной инфекцией. В 2010 году, по данным ВОЗ , от кори умерло 122000 человек, большинство из которых были дети в возрасте до 5 лет.

В последние годы изменились и эпидемические закономерности кори: не отмечается периодичность, отсутствует влияние сезонного фактора, изменилась возрастная структура, сказывается влияние социального статуса, заболеваемость регистрируется преимущественно спорадическая.

Целью наших разработок явилось сравнительное изучение кори у детей в возрасте от 1 мес. до 18 лет